

在接种COVID-19 疫苗后

感谢您完成疫苗注射，您的参与可以帮助我们的社区进一步的终止疫情的大流行。即使是接种了疫苗后，保护他人免于感染还是很重要的。大部份的民众，包括孩童都尚未接种疫苗。遵循下列建议可以保护我们的社区。

1. 配戴两层以上的口罩，并确保口罩很服贴在您的脸上。
2. 在公众场所要和他人保持至少六英尺的距离
3. 常洗手
4. 避免到群众聚集场所
5. 遵循 CDC 的[旅行指南](#)
6. 如果接触到COVID-19，请查询[检疫隔离和检验指南](#)，以了解您是否需要隔离
7. 如果您的检验报告是阳性，请遵循[隔离指南](#)
8. 遵循所有和工作场所或学校相关的指南



已完成疫苗接种? 您可以再开始进行一些因此疫情大流行而被禁止的事了! 请看下一页。

和 COVID-19 疫苗相关的提示:

- 您可能会有些副作用。这是正常的徵兆，表示您的身体正在产生保护力。如果副作用已经干扰到您，或是没有消失，请致电您的家庭医生。
- 如果您在疫苗接种后产生严重的过敏反应，请拨打 **9-1-1**，或者前往邻近的医院。
- 预约您的第二剂接种时间。如果您是接种需两剂的疫苗，在接种第一剂时要记得预约第二剂的接种时间。您需要完成两剂的接种，才会具有对抗 COVID-19 的保护力。
- 疫苗的保护力不是马上产生的。您的身体要在接种完单剂疫苗的两周后，或是在接种完需要两剂疫苗的第二剂的两周之后，才会具有完整的保护力。
- 欲知更多资讯，请浏览 kingcounty.gov/covid/vaccine/ChineseSimp

当您完成疫苗接种后

符合下列之一者才具有完整的疫苗保护力:

- 在接种完需两剂疫苗的第二剂的两周之后 (如莫德纳) 或 辉瑞)
- 在接种完单剂疫苗的两周后 (如 强生)

如果您完成接种但是尚未满两周，或者您仍需要接种您的第二剂，您则**尚未具有完整的疫苗保护力**。请继续遵循所有的保护步骤，直到您完成疫苗接种。

当您已经有完整的疫苗保护力后，您可以:

- 不需要配戴口罩下，和其他有完整疫苗保护力者进行室内聚会
- 不需要配戴口罩下，和其他未接种疫苗但是来自同一家庭者进行室内聚会。如果这些人、或与之同住者中，有人会因感染 COVID-19 而增加导致严重疾病的风险时，则请勿在室内没有配戴口罩下进行聚会
- 如果您接触到感染了 COVID-19 的人，除非您有一些症状，您可能不需要检疫隔离。为了安全起见，请浏览此[检疫隔离指南](#)



不需要配戴口罩下，和其他具有完整疫苗保护力者进行室内聚会



配戴口罩下，可和其他来自不同家庭且未完成疫苗接种者在室内同处

我们仍在了解疫苗在防范COVID-19的传播上有多大的功效。所有的信息时常在更新。您可浏览CDC最新有关具有完整疫苗保护力者的指南:

bit.ly/Chinese-fully-vaccinated